

Ruivangsten in N2000

Versie 21 mei 2019

Controleerbare voorschriften vergunning (algemeen):

- Gemachtigde en mede-uitvoerders dienen op de hoogte te zijn van de inhoud van de vergunning en het uitvoeringsplan.
- Kopie van vergunning en uitvoeringsplan dient aantoonbaar aanwezig te zijn op of nabij het veld waar uitvoering plaats vindt.
- Uitvoering tussen zonsopkomst en zondsondergang van 1 feb tot 1 okt.
- FBE zorgt voor coördinatie en logboek.
- Melding minimaal 1 uur voor aanvang uitvoering (N2000-gebied, datum+tijd, naam uitvoerder etc) via formulier.

Controleerbare punten uit uitvoeringsplan (algemeen):

- Vangploeg bestaat uit een groep van max 6 personen die langzaam varend en/of lopend de ganzen richting vangkraal drijft.
- Voorafgaand aan de vangacties wordt contact opgenomen met de plaatselijke beheerder en wordt de vangstrategie overlegd (voorkomen verstoring en mijden kwetsbare plekken).
- Vanglocaties worden in samenspraak met beheerder vastgesteld.
- Vangperiode 15 mei tot 15 juli.
- Groeilocaties van kwetsbare habitattypen worden niet betreden.
- Gedode ganzen worden uit het gebied meegenomen.

Kwetsbare habitattypen, broedplekken (specifiek per N2000-gebied):

Hoe kennis vernemen over betredingsgevoelige habitats, broedplekken etc? Kaartjes in het uitvoeringsplan zijn minimaal bruikbaar.

Gezien pas heel kort van te voren de exacte locatie bekend wordt en het niet haalbaar is om gedetailleerd het hele N2000 gebied op deze punten in kaart te brengen, stel ik voor dat degene die de ruivangst bijwoont, zelf ook contact op neemt met de gebiedsbeheerder mbt dit onderwerp.

N2000 gebied en TBO'ers	VrI / Hrl Type	ISHD habitat, soorten, vogels (rood = prioritair)	Aandachtspunten Vergunning specifiek	Aandachtspunten Uitvoeringsplan specifiek	Drones in beheerplan
Oostelijke Vechtplassen (OVP) (95) TBO: [naam] [organisatie] [locatie] [mobiel nummer]	VrI VrI+Hrl Meren en moerassen	H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische <i>Chara</i> spp. vegetaties H3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type <i>Magnopotamion</i> of <i>Hydrocharition</i> H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i> H6410 Grasland met <i>Molinia</i> op kalkhoudende, venige, of lemige kleibodem (<i>Molinion caeruleae</i>)	Datum: 7 juli 2015 Kenmerk: 630018/633907 Geldig tot 3-3-2020 Ganzensoorten voor ruivangst: Grauwe gans Brandgans Nijlgans Canadese gans	Groeilocaties kwalificerende habitattypen en broedlocaties kwalificerende vogelsoorten uitgesloten van betreding. > H5 Betredingsgevoelige kwalificerende habitattypen: veenmosrietland, trilvenen, blauwgrasland, vochtige heide, galigaanmoerassen, hoogveenbos > fig 2.1	Geen beheerplan

	<p>H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones H7140 Overgangs- en trilveen H7210 *Kalkhoudende moerassen met <i>Cladium mariscus</i> en soorten van het <i>Caricion davallianae</i> H91D0 *Veenbossen</p> <p>H1016 Zeggekorfslak (<i>Vertigo moulinsiana</i>) H1042 Gevlekte witsnuitlibel (<i>Leucorrhinia pectoralis</i>) H1082 Gestreepte waterroofkever (<i>Graphoderus bilineatus</i>) H1134 Bittervoorn (<i>Rhodeus amarus</i>) H1145 Grote modderkruiper (<i>Misgurnus fossilis</i>) H1149 Kleine modderkruiper (<i>Cobitis taenia</i>) H1163 Rivierdonderpad (<i>Cottus gobio</i>) H1318 Meervleermuis (<i>Myotis dasycneme</i>) H1340 *Noordse woelmuis (<i>Microtus oeconomus arenicola</i>) H1903 Groenknolorchis (<i>Liparis loeselii</i>) H4056 Platte schijfhoren (<i>Anisus vorticulus</i>)</p> <p>A021 Roerdomp (<i>Botaurus stellaris</i>) A022 Woudaap (<i>Ixobrychus minutus</i>) A029 Purperreiger (<i>Ardea purpurea</i>) A068 Nonnetje (<i>Mergus albellus</i>) A119 Porseleinhoen (<i>Porzana porzana</i>) A197 Zwarte stern (<i>Chlidonias niger</i>) A229 IJsvogel (<i>Alcedo atthis</i>)</p> <p>A017 Aalscholver (<i>Phalacrocorax carbo</i>) A041 Kolgans (<i>Anser albifrons</i>) A043 Grauwe gans (<i>Anser anser</i>) A050 Smient (<i>Anas penelope</i>) A051 Krakeend (<i>Anas strepera</i>)</p>	<p>(in al hun verschijningsvormen)</p> <p>Uitvoering niet toegestaan in oktober.</p>	<p>Broedlocaties van kwalificerende broedvogels: roerdomp, porseleinhoen, snor, zwarte stern, ijsvogel, grote karekiet, purperreiger, woudaap (kwalificerende broedvogels) > fig 2.5</p>	
--	---	--	--	--

		<p>A056 Slobeend (<i>Anas clypeata</i>) A059 Tafeleend (<i>Aythya ferina</i>) A292 Snor (<i>Locustella luscinioides</i>) A295 Rietzanger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>) A298 Grote karekiet (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)</p>			
<p>Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld en Twiske (IVOT) (92)</p> <p>TBO: [naam] [organisatie] [locatie] [mobiel nummer]</p>	<p>Vrl Hrl Vrl+Hrl Meren en moerassen</p>	<p>H3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische <i>Chara</i> spp. vegetaties H4010 Noord-Atlantische vochtige heide met <i>Erica tetralix</i> H6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones H7140 Overgangs- en trilveen H91D0 *Veenbossen</p> <p>H1134 Bittervoorn (<i>Rhodeus amarus</i>) H1149 Kleine modderkruiper (<i>Cobitis taenia</i>) H1163 Rivierdonderpad (<i>Cottus gobio</i>) H1318 Meervleermuis (<i>Myotis dasycneme</i>) H1340 *Noordse woelmuis (<i>Microtus oeconomus arenicola</i>)</p> <p>A021 Roerdomp (<i>Botaurus stellaris</i>) A081 Bruine kiekendief (<i>Circus aeruginosus</i>) A151 Kemphaan (<i>Philomachus pugnax</i>) A193 Visdief (<i>Sterna hirundo</i>)</p> <p>A043 Grauwe gans (<i>Anser anser</i>) A050 Smient (<i>Anas penelope</i>) A051 Krakeend (<i>Anas strepera</i>) A056 Slobeend (<i>Anas clypeata</i>) A125 Meerkoet (<i>Fulica atra</i>) A153 Watersnip (<i>Gallinago gallinago</i>) A156 Grutto (<i>Limosa limosa</i>) A292 Snor (<i>Locustella luscinioides</i>) A295 Rietzanger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)</p>	<p>Datum: 29 juni 2015 Kenmerk: 594026/638726</p> <p>Geldig tot: 3-3-2020</p> <p>Ganzensoorten voor ruivangst: Grauwe gans Brandgans Nijlgans Canadese gans Kolgans Rietgans (en al hun verschijningsvormen)</p> <p>Uitvoering niet toegestaan in oktober.</p>	<p>Broedlocaties (natte rietvegetaties) roerdomp, bruine kiekendief en snor worden niet betreden > fig 2.3</p> <p>Groeilocaties van vochtige heiden (laagveengebied) en overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden) worden niet betreden > fig 2.1</p>	<p>Het gebruik van RPA's (alle gewichtsklassen) is in beginsel een vergunningplichtige activiteit binnen een Natura 2000-gebied, met uitzondering van professioneel gebruik van RPA's welke geen verbrandingsmotor hebben en gebruikt worden door inliggende terreineigenaren, -beheerders en toezichthouders ten behoeve van toezicht, monitoring, beheer en inrichting van de natuurterreinen.</p>
